令和８年度第１回和牛改良委員会

日時：令和８年７月１０日（金）１４：００～１５：３０
場所：全農岡山県本部 総合家畜市場 ２階会議室

岡山県農林水産部
畜　産　課
畜産研究所

令和８年度第１回和牛改良委員会
次　　第

１　開　　会

２　あいさつ

３　協議事項

ア．　令和8年度種雄牛作出方針(案)について

イ．　直接検定終了牛等の措置(案)について

ウ．　後代検定終了牛等の措置(案)について

４　その他

５　閉　　会

ア．令和８年度種雄牛作出方針（案）

１）基本方針

岡山県和牛改良増殖対策要綱に定める和牛改良の基本方針に沿って岡山和牛が本来持っている増体能力と岡山固有の遺伝子を維持しながら肉質並びに食味の改良を行い質量兼備の種雄牛造りを行う。

このため、育種価、ゲノミック評価等の遺伝的能力を基本にしながら、産肉能力検定（直接法、現場後代検定法）による優良種雄牛の造成に取り組む。

２）令和８年度指定交配について　　（注）下線は新規種雄牛

① 岡山固有の雌系からの岡山系種雄牛作出

岡山系血液：１／２以上 枝肉重量上位１／４　脂肪交雑　上位１／４以内 体型面においても岡山らしさを有するもの

【交配雄牛】

岡山系血液１／２以上　藤初花　暁之藤　福乃茂 秋藤花国　黒金糸藤　他

【交配雌牛】

別表標記の雌系等　県固有の在来雌牛

② 増体系種雄牛の作出

岡山系血液：１／４以上 枝肉重量上位５％　脂肪交雑　上位１０％以内 体積豊かで体躯が充実しているもの

【交配雄牛】

気高系等　桃岡光２７　福華姫　貴隼桜　福勝鶴　他

【交配雌牛】

増体に優れる雌牛

③ 肉質系種雄牛の作出

岡山系血液：１／４以上 歩留基準値　上位１０％以内　脂肪交雑　上位５％以内 MUFA　平均以上（ゲノミック評価）　NT5E　H/H 骨緊よく品位に富み、資質のよいもの

【交配雄牛】

但馬系等　糸勝百合　花美津照　北美津久　福之鶴 清金幸　他

【交配雌牛】

肉質、脂肪質等に優れる雌牛

但し、上記の作出要件の他、改良委員会が認めるものについてはこれを作出できることとする。

３）造成種雄牛の利用方針

①岡山系種雄牛

交配雌牛：岡山系血液濃度が低く、枝肉重量・脂肪交雑が県平均以上のもの

②増体系種雄牛

交配雌牛：但馬系血液濃度が高いもの

③肉質系種雄牛

交配雌牛：岡山系、気高系血液濃度が高いもの

種雄牛について、福乃茂　福華姫　福之鶴　清金幸　が新規交配牛として追加。

雌系統として以下の系統を主に、県固有の在来雌牛から作出する。

（別表）交配雌牛の主な系統

地域	No.	雌系	始祖牛	特徴
新見	1	さわだ	第１よこた	
	2	たま	はが４	背腰幅、体上線
	3	はやみ	第２きよみ	大型
	4	おかみつ	第２やすほ	
	5	きよふく	きよはな	
	6	はつひめ	ながおか	大型
真庭	7	かずみ	かずみ１２	体上線　皮膚
	8	はつはな	やまはな２	大型
津山	9	あけぼの	第５０あけぼの	藤良系
	10	あきふじ	たけみ	藤良系
	11	ひめいわ	きよひめ	大型
	12	いやさかえ	第２さかえ	

〇ゲノミック評価および遺伝子型を利用した複数世代改良による種雄牛造成（父系における岡山系直系種雄牛の再造成:令和7年度要望課題）


かつて岡山県では、自県特有の父方直系種雄牛が造成されてきたが、現状では、ほぼ途絶えている状況にある。父方直系種雄牛の復活の意味は、遺伝的多様性や未知の能力への期待や、血統図などで岡山和牛の歴史を簡潔かつ明確に示す事ができる存在になることである。
今後も岡山県内の和牛肉ブランドにおいて岡山和牛の歴史を利用するのであれば、父方直系種雄牛の復活は必要不可欠な要素である。

一方、改良が途絶えてから既に長い時間が経過していることから、種雄牛造成しようとしても、現在の産肉能力等のレベルを満たす種雄牛の造成には長い年月がかかってしまう。

そこでゲノミックにより後代検定（枝肉生産）を経ることなく短期間で世代更新を進めることで、改良の途絶えた過去の種雄牛であっても、5～10年後（3代、4代子孫）において、現在の種雄牛と同等の産肉能力を持った岡山直系の種雄牛造成が可能である。

種雄牛候補は、およそ14か月齢以降採精可能となるので、若齢でストローを生産し、本牛は廃用、次世代種雄牛を造成することで、約６年で3世代目の種雄牛が造成できる。


種雄牛舎の繋養期間は、夢糸藤においては約５カ月でストロー生産ができており、後代検定を行っている種雄牛及び基幹種雄牛の繋養計画にも影響を及ぼさない。



ゲノミック評価成績表

氏名	農林水産総合センター畜産研究所
所有者	岡山県農林水産総合センター畜産研究所

続柄	名号	登録番号	個体識別番号	生年月日	性
父	黒金糸藤	原5540			
母	ふじはつさかえ１	原1924508	1439962730	20230226	
本牛	夢糸藤		1697064177	20250117	雄



形質	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS.No.
区分	A	C	B	C	D	B
ゲノミック育種価	30.354	-3.903	0.133	0.049	-0.845	0.332
σ値	0.869	-0.567	0.276	-0.106	-0.764	0.253

形質	MUFA	オレイン酸
ゲノミック育種価	-3.478	-3.323

【夢糸藤】

令和７年１月 17 日生まれ

父：黒金糸藤　　祖父：糸藤

糸藤―千代桜―利花―糸藤



母：ふじはつさかえ１　祖母：みくにさかえ

藤初花―美国桜―第２安平―百合茂

この度、種畜検査に合格し、ストロー生産中。


今後第２世代を作出する。

イ．　直接検定終了牛等の措置（案）について

名号(生年月日)		**福花百合**　(R7.7.2)	**百合秋藤**　(R7.6.22)
血統	父名	花美百合２	花美百合２
	母名	ふくひめはなはな	あきふじ６７
	母の父名	福姫花矢	安福久
	母の祖父名	勝忠平	花茂勝２
検定ｾｯﾄ番号		７－５	７－５
検定期間		R8.2.24　～　R8.6.16	R8.2.24　～　R8.6.16
検定成績	ＤＧ	1.21 kg　《B》	1.05 kg　《C》
	365日補正	447.4 kg　《B》	445.3 kg　《B》
	得点	84.9 点　《A》	83.3 点　《B》
体型（直検終了時点）	体高	125.4 cm　0.8 σ	124.0 cm　0.1 σ
	胸囲	178.0 cm　2.0 σ	179.0 cm　2.0 σ
	胸深	64.5 cm　1.9 σ	64.0 cm　1.4 σ
	尻長	50.0 cm　1.3 σ	49.0 cm　0.6 σ
	かん幅	45.0 cm　1.3 σ	45.0 cm　1.1 σ
	体型グラフ		
本牛ゲノミック評価		本牛Ｇ評価 / 本牛Ｇﾗﾝｸ	本牛Ｇ評価 / 本牛Ｇﾗﾝｸ
	枝肉重量	22.920 kg　B	21.969 kg　B
	ﾛｰｽ芯面積	10.693 ㎠　H	17.263 ㎠　H
	バラ厚	0.441 cm　A	0.110 cm　B
	皮下脂肪厚	0.038 cm　C	-0.326 cm　A
	歩留基準値	1.433　H	2.453　H
	脂肪交雑	3.051　H	1.722　H
	脂質(MUFA)	-1.037	-0.980
	脂質(ｵﾚｲﾝ酸)	-1.161	-1.639
NT5E		HL	HH
SD		正常	正常
コメント		①岡山37:気高27:兵庫36で作出。 ②Ｇ評価は脂肪交雑、ロース芯面積、バラ厚は高い。脂質はややマイナス。 ③発育、体幅、均称に優れるが、やや下けんの切れ上がり、やや被毛の質が惜しまれる。	①岡山35:気高19:兵庫46で作出。 ②Ｇ評価はロース芯面積、皮下脂肪厚等、歩留関連形質が非常に高い。脂質はややマイナス。 ③後躯、体幅、体深に優れるが肩付、肢勢、やや体緊りが惜しまれる。
措置（案）		**去勢後肥育**	**去勢後肥育**

福花百合






R8.6.16現在

11.5か月齢

体高	125.4	cm	0.8 σ
胸囲	178.0	cm	2.0 σ
胸深	64.5	cm	1.9 σ
尻長	50.0	cm	1.3 σ
かん幅	45.0	cm	1.3 σ

百合秋藤





R8.6.16現在

11.8か月齢

体高	124.0	cm	0.1 σ
胸囲	179.0	cm	2.0 σ
胸深	64.0	cm	1.4 σ
尻長	49.0	cm	0.6 σ
かん幅	45.0	cm	1.1 σ

母牛名	母父牛名	祖父牛名	曾祖父牛名	曾々祖父牛名	母牛生年	産子No	性	父牛名	生年月日	と畜年月日	出荷年	出荷月齢	枝重	ロース	ﾊﾞﾗ	皮下	歩留	BMSNo	歩留等級	肉質等級	BCS	光沢	等級1	しまり	きめ	等級2	BFS	光沢	等級3
あきふじ６７	安福久	花茂勝２	第２富藤	第６藤森	平26	5	去	美国桜	R4.2.21	R6.6.17	2024	27.8	400.4	59	6.5	2.3	74.3	5	A	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5
あきふじ６７	安福久	花茂勝２	第２富藤	第６藤森	平26	4	去	平白鵬	R2.11.26	R5.5.24	2023	29.9	528	97	9.5	2.2	79.8	12	A	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
あきふじ６７	安福久	花茂勝２	第２富藤	第６藤森	平26	3	去	美国桜	R1.9.17	R4.3.1	2022	29.5	614.2	107	8.4	2.5	78.9	9	A	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
あきふじ６７	安福久	花茂勝２	第２富藤	第６藤森	平26	2	去	平白鵬	H30.9.14	R3.2.17	2021	29.2	461	100	9.2	2.6	80.4	10	A	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
あきふじ６７	安福久	花茂勝２	第２富藤	第６藤森	平26	1	去	美国桜	H29.7.10	R1.11.8	2019	28.0	383.3	59	7.8	1.7	75.9	12	A	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
祖母名																													
かつはなはな	勝忠平	利花	北国７の８	糸藤	令1	2	去	福姫花矢	R4.9.6	R7.4.15	2025	31.3	630.8	105	9	2.5	78.9	10	A	5	4	**5**	5	5	5	5	3	5	5

検定牛名号　**福花百合**　　子牛記号番号　2025子岡黒2147　1692664614

生年月日　令和7年7月2日生　　産　地　岡山県新久米郡美咲町北

検定場　岡山県農林水産総合Ｃ畜産研究所　　検定期間　令和8年2月24日 ～ 令和8年6月16日

(112日間)

所有者　岡山県農水セ畜産研究　　育種価評価年月　令和8年2月　　地域　岡山

花美百合２	美国桜	第１花国	北国７の８
黒原　6358(85.1)	黒原　5204(84.0)	黒　12510(82.8)	黒原　1530［島根・大田］
	［栃木・那須］	［青森・つが］	あおはな
		もとみつ	黒高 1240927［島根・安来］
［岡山・久米］	間検		美津福
	H27	黒原 1280419(81.7)	黒原2748　［兵庫・美方］
	ゆりはなや	［栃木・那須］	もとじろう
		百合茂	黒186811　［栃木・那須］
	黒 2421010(80.1)		平茂勝
		黒原　4086(88.8)	黒原 2441　［鹿児・薩摩］
直検 1.21	［岡山・久米］	［鹿児・薩摩］	しらゆり
		しんはなや１０	黒 1968419［鹿児・薩摩］
			安福久
育種価AAACBA		黒原 1527484(84.1)	黒原　4416［栃木・那須］
		［岡山・真庭］	しんはなや１
			黒高 205435［岡山・真庭］
ふくひめはなはな	福姫花矢	福之姫	芳之国
			黒14203　［栃木・鹿沼］
黒原1938271(82.3)	黒原6434(85.0)	黒原5689(82.7)	ふくひめ３
		［栃木・大田］	黒原1345236［鹿児島・薩摩］
	［岡山・新見］	はなゆり３	
	直検 1.28　G=21		百合茂
［岡山・久米］	現検	黒原 1723516(82.6)	黒原4086　［鹿児島・薩摩］
	R05	［岡山・加賀］	しんはなや１０
			黒原15274584［岡山・加賀］
	かつはなはな	勝忠平	平茂勝
			黒原 2441　［鹿児・薩摩］
	黒原1814731(81.9)	黒原 3800(87.5)	うめ２
		［鹿児・薩摩］	黒原 788266［鹿児・薩摩］
産子番号　1	［岡山・久米］	はなはな	利花
			黒原3505　［岡山・久米］
(平成5年9月28日生)		黒原 1289543(82.0)	第６はなや３
		［岡山・久米］	黒原936881［岡山・久米］

開始時日齢		237.0	発育	開始時	８週時	終了時	飼料摂取量		余剰飼料摂取量(kg)		
体重	生時	39.0	体高	115.4	122.0	125.4	粗飼料摂取率	46	記録	育種価(※)	
	開始時	292.0	胸囲	152.0	165.0	178.0	濃厚飼料	437	-53		
	８週時	357.0	胸深	58.0	61.5	64.5	粗飼料	368	-164		
	終了時	428.0	尻長	44.0	47.0	50.0	ＣＰ	101.0	-5		
	180補正体重	231.2	かん幅	39.0	41.5	45.0	ＴＤＮ	513.0	-74		
	365補正体重	447.4	終了時審査得点		84.9		開始	美点	発育、体深、被毛の質		
一日平均増体量	前半	1.16	σ判定	終了時体高	0.76σ	栄養度(終了時)		欠点	やや体上線、やや下腰部の切れ上がり、やや尻の形		
	後半	1.27		終了時体重	0.89σ	6	終了	美点	発育、体幅、均称		
	全期間	1.21	精液検査					欠点	やや下けんの切れ上がり、やや被毛の質		

検定牛名号	百合秋藤	子牛記号番号	2025子受卵岡黒2143　1690774981
生年月日	令和7年6月22日生	産　　地	岡山県新久米郡美咲町北
検定場	岡山県農林水産総合Ｃ畜産研究所	検定期間	令和8年2月24日 ～ 令和8年6月16日 (112日間)
所有者	岡山県農水セ畜産研究	育種価評価年月	令和8年2月　　地域　岡山

<table>
<tr>
<td rowspan="8">花美百合２
黒原　6434(81.9)
[岡山・新見]
直検 1.28</td>
<td rowspan="4">美国桜
黒原　5204(84.0)
[栃木・那須]
間検
H27</td>
<td rowspan="2">第１花国
黒　12510(82.8)
[青森・つが]</td>
<td>北国７の８
黒原　1530 [島根・大田]</td>
</tr>
<tr>
<td>あおはな
黒高 1240927 [島根・安来]</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">もとみつ
黒原 1280419(81.7)
[栃木・那須]</td>
<td>美津福
黒原2748 [兵庫・美方]</td>
</tr>
<tr>
<td>もとじろう
黒186811 [栃木・那須]</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">ゆりはなや
黒 2421010(80.1)
[岡山・久米]</td>
<td rowspan="2">百合茂
黒原　4086(88.8)
[鹿児・薩摩]</td>
<td>平茂勝
黒原 2441 [鹿児・薩摩]</td>
</tr>
<tr>
<td>しらゆり
黒 1968419 [鹿児・薩摩]</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">しんはなや１０
黒原 1527484(84.1)
[岡山・真庭]</td>
<td>安福久
黒原　4416 [栃木・那須]</td>
</tr>
<tr>
<td>しんはなや１
黒高 205435 [岡山・真庭]</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="8">あきふじ６７
黒原1669580(82.1)
[岡山・久米]
育種価　DACBAB_D-
産子番号　9
(平成26年7月26日生)</td>
<td rowspan="4">安福久
黒原 4416(85.5)
[栃木・那須]</td>
<td rowspan="2">安福１６５の９
黒原4990(83.0)
[広島・庄原]</td>
<td>安福（岐阜）
黒育180 [兵庫・美方]</td>
</tr>
<tr>
<td>しげふじ１３の７
黒高67760 [岐阜・高山]</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">もとじろう
黒1868119(82.5)
[栃木・那須]</td>
<td>紋次郎
黒高 2040 [鳥取・鳥取]</td>
</tr>
<tr>
<td>もとひかり
黒原645592 [島根・出雲]</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">あきふじ６
黒原1389906(82.0)
黒高217319
[岡山・苫田]
枝肉　4</td>
<td rowspan="2">花茂勝２
黒原　4033　(82.2)
[岡山・真庭]</td>
<td>平茂勝
黒原　2441 [鹿児・薩摩]</td>
</tr>
<tr>
<td>第６はなや３
黒原936881 [岡山・久米]</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">第１０あきふじ
黒原1135044(83.7)
[岡山・苫田]</td>
<td>第２富藤
黒原 2129 [岡山・津山]</td>
</tr>
<tr>
<td>あきふじ
黒原 630169 [岡山・苫田]</td>
</tr>
</table>

開始時日齢		247.0	発育	開始時	８週時	終了時	飼料摂取量		余剰飼料摂取量(kg)	
体重	生時	38.6	体高	115.0	120.0	124.0	粗飼料摂取率	47	記録	育種価(※)
	開始時	321.0	胸囲	156.0	168.0	179.0	濃厚飼料	418	-79	
	８週時	377.0	胸深	57.0	60.0	64.0	粗飼料	368	-172	
	終了時	439.0	尻長	44.0	46.5	49.0	ＣＰ	98.0	-9	
	180補正体重	244.4	かん幅	40.5	42.0	45.0	ＴＤＮ	500.0	-91	
	365補正体重	445.3	終了時審査得点		83.3		開始 美点	発育、体積、体上線		
一日平均増体量	前半	1.00	σ判定	終了時体高	0.12σ	栄養度(終了時)	開始 欠点	肢勢、後肢の蹄、やや肩端		
	後半	1.11		終了時体重	0.90σ	6	終了 美点	後躯、体幅、体深		
	全期間	1.05	精液検査				終了 欠点	肩付、肢勢、やや体緊り		

直接検定・後代検定実施スケジュール

直検選抜年度	名　　号	生年月	血　　統					ゲノム評価					令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度
			父	母	母の父	母方祖父	母方祖父	枝重	ﾛｰｽ	バラ	BMS	MUFA					
3	花 美 津 照	R3.1	美津照重	はなやさくら	美国桜	勝忠平	安福165の9	B	A	B	H	3.78					
4	花美百合２	R3.8	美国桜	ゆりはなや	百合茂	安福久	平茂勝	A	H	H	H	-0.64					
	福 之 勝 糸	R3.4	福之姫	かついとかずみ	勝忠平	糸藤(岡山)	安福165の9	H	H	H	H	-0.53					
5	福　華　姫	R4.12	福之姫	しんはなや１０１	百合茂	安福久	平茂勝	H	H	H	H	1.50					
6	光 和 美 1	R5.4	新岡光８１	やすふくかずみ１	安福久	勝忠平	糸藤(岡山)	H	H	B	H	-0.06					
	光　安　照	R5.4	新岡光８１	ゆりやすてる１	百合茂	美国桜	安福久	H	H	A	H	2.03					
7	吉 備 和 美	R6.4	知恵久	なおひめかずみ	福之姫	直太朗	安福久	B	H	D	H	-0.43					
	糸 勝 高 水	R6.8	糸勝百合	ひめたかみず４	福之姫	茂洋	平茂勝	H	H	H	H	1.00					
	第 6 曙 藤	R6.9	茂晴花	てったあけぼの	新岡光８１	沢茂勝	安平照	H	H	A	H	3.76					
	鶴　和　美	R7.1	福之鶴	ゆりかずみ７	百合白清２	茂花国	平茂勝	A	H	H	H	3.15					
8	百 合 秋 藤	R7.6	花美百合２	あきふじ６７	安福久	花茂勝２	第２富藤	B	H	B	H	-0.98					
	福 花 百 合	R7.7	花美百合２	ふくひめはなはな	福姫花矢	勝忠平	利花	B	H	A	H	-1.04					
8	花 久 高 水	R7.9	花美津照	たかみず８２の２	久茂福	美恵茂	藤沢茂	B	H	C	H	2.38					

直接検定

調整交配

検定牛
出生 ～ 肥育

枝肉成績

ウ.　後代検定終了牛等の措置(案）について

（１）名　　号　　花美津照　（黒原６４９８　体型得点８４．４）

① 生年月日　令和３年１月30日

② 血　　統

父：美津照重　　父の父：美津照

父の母：いつみ　父の祖父：美津福

母：はなやさくら　　母の父：美国桜

母の母：はなやひら　　母の祖父：勝忠平

③ 検定期間

開始：令和６年２月５日～終了：令和８年２月３日

④ 枝肉成績

区分	頭数	出荷月齢	枝肉重量	ﾛｰｽ芯面積	バラ厚	皮下脂肪	歩留基準値	脂肪交雑
去勢	12	27.6	472.2	67.5	7.7	3.0	74.7	9.6
雌	14	27.9	472.2	73.1	8.2	4.0	74.9	9.6
全体	26	27.8	472.2	70.5	8.0	3.5	74.8	9.6

・MUFA 割合（及びオレイン酸割合）：去勢 57.4%（51.8%）、雌 59.9%（55.8%）

・NT5E：HH

・骨格粗大症（SD）：正常

A:枝肉重量		B:ﾛｰｽ芯面積		C:バラ厚		D:皮下脂肪厚		E:歩留基準値		G:脂肪交雑	
PVB:A	ﾗﾝｸA	PVB:B	ﾗﾝｸB	PVB:C	ﾗﾝｸC	PVB:D	ﾗﾝｸD	PVB:E	ﾗﾝｸE	PVB:G	ﾗﾝｸG
21.592	D	19.212	B1	0.149	D	0.280	D	2.138	C	2.870	A1

オレイン酸		MUFA(R8.1)		あらさ指数		細かさ指数	
BV	ﾗﾝｸ	BV	ﾗﾝｸ	BV	ﾗﾝｸ	BV	ﾗﾝｸ
2.100	A1	1.332	A3	-2.83	3%	0.44	1%

⑤ 措置及び理由

措　置：　選　抜

理　由：　第 63 回育種価の枝肉６形質において、突出したところはないが、NT5E が HH であること、オレイン酸 A1 ﾗﾝｸ、MUFA　A3 ﾗﾝｸ、あらさ指数上位３%、細かさ指数上位１%とおいしさ関連形質については高い。生時体重から大きくないと考えられ、初産に使える但馬系種雄牛として選抜したい。

現 場 後 代 検 定 情 報

花 美 津 照（はなみつてる）



生年月日：令和３年１月30日
登録番号：黒原6498（84.4）
産　　地：吉備中央町
生 産 者：亀山　幾夫

＜血　統＞

美津照重	美津照	美津福	谷福土井
		きくつるみ２	照長土井
	いつみ	美津福	谷福土井
		よしこ６	糸秀
はなやさくら	美国桜	第１花国	北国７の８
		もとみつ	美津福
		勝忠平	平茂勝
	はなやひら	はなや２２０	安福１６５９の

育種価（改良センターG評価）

区分	ランク
枝肉重量	B1
ロース芯面積	A2
バラの厚さ	B2
皮下脂肪厚	C
歩留基準値	B1
脂肪交雑	3%
MUFA	A3
オレイン酸	A3

現場後代検定牛　枝肉成績

	No.	母の父	母の祖父	母の曽祖父	生時体重	出荷月齢	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	脂肪交雑	格付	オレイン酸	MUFA
去勢	1	光平照	糸福(大分)	平茂勝	32.0	27.6	470.0	68	6.7	3.5	73.7	8	A-5	52.4	57.4
	2	茂晴花	勝忠平	利花	33.0	26.8	477.0	78	7.5	2.4	76.0	11	A-5	50.8	55.7
	3	藤沢茂	松福美	北国７の８	34.0	28.2	474.2	77	8.2	3.7	75.7	8	A-5	54.2	60.2
	4	安福久	百合茂	平茂勝		27.2	446.8	60	6.8	1.6	74.7	9	A-5		
	5	花茂勝２	福栄	糸藤(岡山)		29.0	435.4	57	7.8	3.0	73.9	7	A-4		
	6	福増	安茂勝	北国７の８		28.3	474.6	57	8.3	2.0	74.6	11	A-5		
	7	福増	沢茂勝	第５隼福		28.3	470.5	55	7.7	2.1	73.9	9	A-5		
	8	百合茂	金幸	忠福	38.1	26.0	459.8	69	7.0	3.5	74.2	12	A-5	50.5	56.0
	9	平茂晴	平茂勝	安福１６５９の	35.3	27.6	471.4	71	8.6	4.0	74.9	10	A-5	51.3	57.5
	10	百合白清２	福栄	東平茂		27.5	445.8	78	7.0	3.9	75.2	11	A-5		
	11	第２平茂勝	美津福	北仁	38.0	27.1	489.6	58	7.1	3.0	72.9	7	A-4		
	12	芳之国	美津照重	百合茂		27.9	551.0	82	9.6	2.8	77.1	12	A-5		
	平均				35.1	27.6	472.2	67.5	7.7	3.0	74.7	9.6	5率 83%	51.8	57.4
雌	1	藤沢茂	糸藤(岡山)	平茂勝	25.5	27.8	479.0	70	9.0	4.5	74.5	11	A-5	57.5	61.9
	2	北盛栄	百合茂	平茂勝	31.0	28.5	471.2	73	7.7	2.8	75.6	10	A-5	56.5	61.7
	3	新高水	北仁	沢茂勝	31.0	29.6	507.0	86	9.0	5.5	75.3	11	A-5	57.6	61.7
	4	百合茂	安福久	忠富士	30.0	28.9	518.0	75	8.5	5.5	73.4	9	A-5	59.5	63.9
	5	藤沢茂	美津福	北国７の８	20.0	28.8	452.6	80	7.9	4.0	75.9	10	A-5	59.6	63.1
	6	北盛栄	花茂勝２	平田	26.3	26.9	449.2	74	8.0	4.5	74.7	8	A-5	52.3	57.3
	7	安福久	平茂勝	紋次郎		28.0	413.8	68	6.7	3.4	74.5	11	A-5	51.9	54.8
	8	第１花福	平茂勝	福桜(宮崎)	35.6	27.1	506.8	67	9.6	3.8	74.8	10	A-5	56.9	61.0
	9	幸紀雄	平茂晴	安福久		26.1	458.0	76	8.0	3.4	75.8	9	A-5	55.2	60.4
	10	平茂晴	勝忠平	福栄		26.2	453.2	61	8.0	4.5	73.0	7	A-4	56.2	60.0
	11	勝乃幸	平茂晴	勝忠平		26.1	503.2	83	8.5	3.6	76.4	11	A-5	56.4	61.1
	12	第２平茂勝	安糸	平茂勝	37.0	27.9	471.8	56	7.0	3.2	72.7	4	A-3		
	13	美国桜	光平照	勝忠平		28.9	439.2	72	7.5	3.8	74.9	11	A-5	55.0	58.9
	平均				29.6	27.8	471.0	72.4	8.1	4.0	74.7	9.4	5率 85%	56.2	60.5
平均					31.9	27.7	471.6	70.0	7.9	3.5	74.7	9.5	5率 84%	54.9	59.6

現 場 後 代 検 定 情 報

はなみゆり2
花美百合2



生年月日：令和３年８月５日
登録番号：黒15929（83.9）
産　　地：岡山市
生 産 者：有安　力

＜血　統＞

美国桜	第１花国	北国７の８	第７糸桜
		あおはな	花桜
	もとみつ	美津福	谷福土井
		もとじろう	糸秀
ゆりはなや	百合茂	平茂勝	第２０平茂
		しらゆり	神高福
	しんはなや１０	安福久	安福１６５の９
		しんはなや１	平茂勝

育種価（改良センターG評価）

区分	ランク
枝肉重量	A3
ロース芯面積	1%
バラの厚さ	A2
皮下脂肪厚	B1
歩留基準値	1%
脂肪交雑	3%
MUFA	C
オレイン酸	C

現場後代検定牛　枝肉成績

	No.	母の父	母の祖父	母の曾祖父	生時体重	出荷月齢	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	脂肪交雑	格付	オレイン酸	MUFA
去勢	1	新岡光８１	平鶴	利花	21.5	28.6	493.2	76	7.7	2.5	76.0	10	A-5	51.9	56.3
	2	新岡光８１	平鶴	利花	21.4	28.1	447.8	87	8.0	1.5	79.1	10	A-5	49.5	53.1
	3	新岡光８１	義勝成	茂洋	34.0	27.9	491.6	82	8.5	2.3	77.6	10	A-5	56.3	60.5
	4	藤沢茂	花茂勝２	北国７の８	33.5	27.4	510.8	64	8.5	3.0	74.3	8	A-5	52.7	56.5
	5	美津照重	藤勝栄	利花	35.2	27.2	445.6	85	7.7	1.5	78.6	11	A-5	50.3	53.7
	6	金照	第１花国	勝忠平	44.0	27.3	444.5	73	8.1	1.4	77.4	11	A-5		
	7	美津照重	第１花国	勝忠平	29.0										
	8	安茂勝	第５隼福	平茂勝	41.0										
	9	安茂勝	神高福	第２０平茂	45.0										
	10	勝忠平	安平	糸晴（佐賀）		26.7	427.0	69	8.1	1.3	77.3	12	A-5		
	11	百合茂	福之国	安平											
	12	隆之国	安平	隆美		26.3	510.0	95	9.0	2.4	79.3	11	A-5	55.8	60.2
	去勢平均				33.8	27.4	471.3	78.9	8.2	2.0	77.5	10.4	5率 100%	52.8	56.7
雌	1	新初英	北仁	沢茂勝	26.5	26.2	414.6	80	9.0	3.1	77.9	10	A-5	55.5	59.6
	2	幸紀雄	芳之国	美津照重	32.0	28.3	507.0	81	9.6	2.7	77.6	12	A-5	60.8	65.1
	3	藤沢茂	千代桜	勝忠平	40.5	27.9	575.4	93	9.6	3.5	77.7	11	A-5	58.1	63.0
	4	藤沢茂	花国安福	百合茂	27.0	27.9	444.8	86	8.3	2.8	78.1	8	A-5	53.2	55.6
	5	美咲鶴	西花８	沢茂勝	28.0	27.6	448.2	89	8.8	4.0	77.7	10	A-5	55.9	60.4
	6	新岡光８１	美津照重	百合茂	34.0	27.4	471.0	110	8.0	2.5	80.9	11	A-5	55.2	59.5
	7	幸紀雄	安福久	百合茂		29.1	446.4	70	8.9	1.8	77.2	11	A-5		
	8	美津照重	第５北盛	平茂勝	38.0										
	9	諒太郎	茂洋	平茂勝	31.0	28.4	495.2	82	9.1	3.6	76.8	8	A-5	54.6	58.3
	10	高百合	茂洋	北国７の８		27.3	480.0	83	9.0	1.9	78.5	11	A-5	50.2	54.8
	雌平均				32.1	27.8	475.8	86.0	8.9	2.9	78.0	10.2	5率 100%	55.4	59.5
総平均					33.0	27.6	473.7	82.6	8.6	2.5	77.8	10.3	5率 100%	54.3	58.3

注）上記成績は速報のため確定ではありません。